

Felv

La leucemia felina (Felv) è una malattia contagiosa, molto diffusa fra i gatti, causa di elevata mortalità. Il virus della Felv (Retrovirus) è trasmesso facilmente mediante saliva, secrezioni, sangue o urina, il virus è comunque molto labile e viene inattivato rapidamente dal calore, dall'acqua, dai disinfettanti. Il contagio può avvenire anche nelle fasi iniziali della malattia, quando il gatto non manifesta ancora sintomi. Una gatta, se infetta, può trasmettere il virus ai gattini durante la gravidanza.

Questa patologia può manifestarsi a diversi stadi:

- Transitorio, quando l'organismo del gatto riesce a neutralizzare l'infezione spontaneamente nel giro di un paio di mesi;
- Latente, quando il virus è presente nel midollo osseo e viene stimolato ad attivarsi attraverso alcuni eventi (infezioni di altro tipo, cure mediche immunosoppressive, ecc.);
- Conclamato, quando il gatto presenta tutti i sintomi delle patologie indotte dalla immunodeficienza ed è ad altissimo rischio per la sopravvivenza.

Tali patologie possono essere neoplasie linfoidi maligne, disordini di vario genere ed entità a carico dell'apparato digerente, respiratorio ed urinario, predisposizione allo sviluppo di tumori maligni di diverso tipo e localizzazione. Una lesione osservata molto di frequente in gatti affetti da questa patologia sono le stomatiti ulcero-proliferative che spesso rappresentano proprio il campanello d'allarme più evidente per il veterinario. Una cura vera e propria attualmente non esiste: la durata e la qualità di vita del gatto dipende fortemente dalla precocità della diagnosi e dalla assiduità con cui viene sottoposto a tutte le cure mirate a contrastare le malattie accessorie che essa provoca. La casistica riferisce di gatti deceduti dopo qualche settimana dalla contrazione del virus ed altrettanti soggetti che con esso hanno convissuto per anni (dai 3 ai 5 anni). Proprio perché non è possibile debellare il virus della Felv è molto importante fare della appropriata prevenzione vaccinale. Quando il gatto viene vaccinato, il suo sistema immunitario riconosce come "estranei" i virus indeboliti e le proteine della Felv e produce anticorpi atti a combatterli. I gattini possono essere vaccinati a partire dalle 8 settimane di vita, con un richiamo dopo 1 mese, successivamente devono essere vaccinati 1 volta l'anno. Prima di effettuare la vaccinazione è opportuno eseguire un test di positività alla Felv, che consiste in un semplice prelievo di sangue. La positività al test è assolutamente certa e non lascia dubbi, però è possibile che il gatto si trovi nella fase iniziale in cui il sistema immunitario sta lottando contro il virus, per questo motivo, se non vi sono sintomi evidenti della malattia, è opportuno ripetere il test dopo 6 mesi dal primo.

Amici del Gatto di Cecina – Ass. ONLUS

Ci sono diversi modi per darci una ... zampa !

Adottando un gatto dal gattile o a distanza

Portando cibo o lettiera al ns. rifugio

con bonifico bancario: IBAN IT 33 Y 06370 70695 0000 1007 6060

con carta di credito o PayPal da www.gattiledicecina.it

con una firma sulla dichiarazione dei redditi per il 5x1000 c.f. : 01493920498

Donandoci i Punti Cuore Conad

www.gattiledicecina.it